

Lefax[®] extra

Kautabletten

Wirkstoff: Simeticon 105 mg

Gebrauchsinformation

www.lefax.de



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss *Lefax extra Kautabletten* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 4 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist *Lefax extra Kautabletten* und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Lefax extra Kautabletten* beachten?
3. Wie ist *Lefax extra Kautabletten* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Lefax extra Kautabletten* aufzubewahren?

Lefax[®] extra Kautabletten

Wirkstoff: Simeticon 105 mg

Zusammensetzung:

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Simeticon.
1 Kautablette enthält 105 mg Simeticon.
Die sonstigen Bestandteile sind: Glucose (Ph.Eur.),
Sucrose, mikrokristalline Cellulose, Glyceroldistearat

(Ph.Eur.), Hyetellose, Fenchelöl, Pfefferminzöl,
Kümmelöl.

Hinweis für Diabetiker: 1 Kautablette enthält 0,07
Broteinheiten (BE).

Darreichungsform und Inhalt:

Lefax extra Kautabletten ist in Packungen mit 20 oder
50 Kautabletten erhältlich.

1. Was ist *Lefax extra Kautabletten* und wofür wird es angewendet?

Lefax extra Kautabletten ist ein entschäumend wirkendes
Arzneimittel.

von: Bayer Vital GmbH, D-51368 Leverkusen
hergestellt von: AMAREG GmbH,
Donaustauer Straße 378, 93055 Regensburg

Lefax extra Kautabletten wird angewendet:

- Zur symptomatischen Behandlung von
- gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden (Meteo-
rismus), z. B. Blähungen, Blähungsschmerzen,
Spannungsgefühl und verstärkter Gasbildung nach
Operationen
- funktionellen Beschwerden des oberen Magen-
Darm-Traktes (funktionelle Dyspepsie) wie Völle-
gefühl, Schmerzen/Druckgefühl im Oberbauch,
Aufstoßen, Übelkeit, vorzeitiges Sättigungsgefühl,
Breachreiz.
- Zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen
im Bauchbereich zur Reduzierung von Gasschatten
(Sonographie, Röntgen).

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Lefax extra Kautabletten* beachten?

Lefax extra Kautabletten darf nicht eingenommen werden

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber
Simeticon oder einem der sonstigen Bestandteile von
Lefax extra Kautabletten sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Lefax extra Kautabletten* ist erforderlich:

Bei neu auftretenden und/oder länger anhaltenden
Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen,
damit die Ursache der Beschwerden und eine unter
Umständen zugrundeliegende, behandlungsbedürftige
Erkrankung erkannt werden kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von
Lefax extra Kautabletten während der Schwangerschaft
und Stillzeit.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen
erforderlich.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von *Lefax extra Kautabletten*

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose und Glucose. Bitte
nehmen Sie *Lefax extra Kautabletten* daher erst nach
Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt
ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

1 Kautablette enthält 0,5 g Glucose und 0,4 g Sucrose
(Zucker) entsprechend ca. 0,07 Broteinheiten (BE).
Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten
Sie dies berücksichtigen.

Lefax extra Kautabletten kann schädlich für die Zähne
sein (Karies).

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind
nicht bekannt.

3. Wie ist *Lefax extra Kautabletten* einzunehmen?

Nehmen Sie *Lefax extra Kautabletten* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Nehmen Sie die Kautabletten zu oder nach den Mahlzeiten und bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen ein. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die *Lefax extra Kautabletten* gut **zerkaut** werden.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter	Einzelosis	Tagesgesamtdosis
Jugendliche und Erwachsene	1 - 2 Kautabletten (entsprechend 105 mg bis 210 mg Simeticon)	3 - 8 Kautabletten (entsprechend 315 mg bis 840 mg Simeticon)

Für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren steht eine Kautablette mit 42 mg Wirkstoffgehalt zur Verfügung.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden.

Sie können *Lefax extra Kautabletten*, falls erforderlich, auch über längere Zeit einnehmen.

Zur Vorbereitung diagnostischer Untersuchungen beträgt die empfohlene Dosierung 3 bis 4 mal täglich 1 Kautablette (315 – 420 mg Simeticon) am Tag vor der Untersuchung und 1 Kautablette (105 mg Simeticon) am Morgen des Untersuchungstages.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Lefax extra Kautabletten* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge *Lefax extra Kautabletten* eingenommen haben als Sie sollten
Vergiftungen durch *Lefax extra Kautabletten* sind bisher nicht bekannt. Der Wirkstoff Simeticon wird nicht in die Blutbahn aufgenommen. Auch große Mengen *Lefax extra Kautabletten* werden problemlos vertragen.

Wenn Sie die Einnahme von *Lefax extra Kautabletten* vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Auswirkungen, wenn die Behandlung mit *Lefax extra Kautabletten* abgebrochen wird

Die Beschwerden können wieder auftreten.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von *Lefax extra Kautabletten* sind bisher nicht bekannt geworden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bei sich bemerken.

5. Wie ist *Lefax extra Kautabletten* aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 30° C lagern!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Blister bzw. Umkarton angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Stand der Information: Mai 2005

Bayer